


نشرة عدد : 3 / 2011

التوقعات الموسمية للفترة : يوليو - أغسطس - سبتمبر 2011

و على المجال الشاطئي من الكامرون و غينيا بيساو فإن الاحتمال الأكبر هو لعجز في مجموع الأمطار . إذ يتراوح احتمال الإمطار المتوسط بين 70 و 100% على المنطقة III. و قد تم إظهار توافق بين كافة الوسائل مؤكدا أن بداية موسم الأمطار في منطقة الساحل الإفريقي للعام 2011 ستكون طبيعية ابتداءً من العشرية الثالثة لشهر يونيو 2011.



الهيدرولوجيا :

تظهر التوقعات الموسمية للسريان في الأحواض النهرية في منطقة الساحل الإفريقي للفترة يوليو - أغسطس - سبتمبر 2011 احتمال سيناريو معتدل إلى فانض مع درجة وثوق من 50 إلى 30% على التوالي و ذلك على مستوى محطة باكل على نهر السنغال

ملاحظة : إذا ما استمر التبريد المعن عنه على المحيط الأطلسي المداري الشمالي خلال شهري يوليو و أغسطس، فإنه من المحتمل أن تؤثر هذه الوضعية على المجاميع المطرية المتوقعة على موريتانيا محدثة جيوبا متفرقة منعزلة للعجز المطري.

سيتم نشر تحديث لهذه التوقعات خلال شهر يوليو 2011. أما توقعات الرصد الجوي ذات الأجل اليومية و العشرية لموريتانيا فيمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية:

[http:// www.onm.mr](http://www.onm.mr)

كما ذكرنا في نشرتنا السابقة، فإن التوقعات الموسمية للأمطار في منطقة الساحل الإفريقي تركز على الخصائص الأحدث لحرارة سطح البحر في المحيط الهادي الإستوائي و المحيط الأطلسي المداري.

حالة المحيطات في يونيو و الاتجاهات العامة

على المحيط الأطلسي المداري الشمالي قبالة الشواطئ الغرب إفريقية، استدامت حرارة سطح البحر الأعلى من المتوسط التي لوحظت خلال شهر إبريل حتى بداية يونيو 2011 مع شذوذ تبرد محلي منعزل في تنام . و يظهر تحديث الاتجاهات العامة و مخارج النماذج العددية للتوقعات إمكانية كبيرة لتراجع حرارة سطح البحر لمستوى المتوسط على المحيط الأطلسي المداري الشمالي خلال الفترة : يوليو - أغسطس - سبتمبر 2011.

و على المحيط الأطلسي المداري الجنوبي تظهر مخارج النماذج العددية للتوقعات و الاتجاهات العامة أن الظروف مهيأة لتراجع التسخين الملاحظ لمستوى المعدل الحراري على معظم الأجزاء الشرقية للمحيط الأطلسي المداري الجنوبي من يونيو و حتى سبتمبر 2011.

بينما تعطي الاتجاهات العامة و مخارج النماذج العددية للتوقعات ظروفا مهيأة لوضعية ENSO محايدة على المحيط الهادي الاستوائي خلال الفترة يوليو - أغسطس - سبتمبر 2011.

التوقعات

وفقا للاتجاهات العامة الحالية و الحالة العامة للمحيطات الموضحة أعلاه، و باستخدام الوسائل الإحصائية الديناميكية للتوقعات الموسمية، فإن توقعات المجاميع المطرية للفترة : يوليو - أغسطس - سبتمبر 2011 في منطقة الساحل الإفريقي تكون كالتالي (انظر الشكل المقابل):

على الجزء الغربي من الساحل الإفريقي (المنطقة I) و تهم السنغال و غامبيا و مالي و بوركينا فاسو و جنوب موريتانيا و الأجزاء الشمالية لغينيا كوناكري و الكوت ديفوار و غانا و التوغو و البنين، حيث ستتراوح المجاميع المطرية بين المعدل و الزيادة على المتوسط. إذ احتمال إمطار متوسط من حوالي 80% إلى 120% لهذا النطاق.

و على شرق الساحل الإفريقي (المنطقة II) و التي تغطي النيجر و تشاد و شمال نيجيريا و الكامرون، حيث احتمال مجموع أمطار متوسط من حوالي 100% إلى 130% على أجزاء كبيرة من هذه المنطقة.